

PM Insulin vid behov inneliggande patient

Används efter läkarordination vid

- Akuta sjukdomar som tillfälligt (högst 1-2 dagar) kräver extra insulintillförsel såsom infektioner, trauma, stroke, gangrän, gastroenterit, och kortisonbehandling
- Därefter bedömning från dag till dag

Används INTE vid

- Diabetisk Keto-Acidosis (DKA) eller Hyperglykemiskt Hyperosmolärt Syndrom (HHS), se särskilt PM.
- Vid allmänt dåligt reglerat sockerläge och insulininställning vid nyupptäckt diabetes. Gör individuell bedömning dag för dag.
- Akut dålig patient där vi snabbt vill normalisera blodsockret.

1. Kost-, tablett, enbart basinsulin eller mixinsulin

- Fortsatt grundbehandling.
- Om patienten inte äter skall iv Glukos 10 % ordinaras
- Extra till huvudmåltider (frukost, lunch, middag):

P-Glukos	Extra Ordination till måltiden
> 17 mmol/l	14 E Apidra, Humalog eller Novorapid sc
> 12 mmol/l	10 E Apidra, Humalog eller Novorapid sc
> 10 mmol/l	6 E Apidra, Humalog eller Novorapid sc

Extra kvälls och nattetid och ny kontroll efter 4 timmar

P-Glukos	Extra Ordination
> 20 mmol/l	6 E Apidra, Humalog eller Novorapid sc
> 15 mmol/l	4 E Apidra, Humalog eller Novorapid sc

2. Insulin i flerdos (med måltidsinsulin)

- Om patienten inte äter skall iv Glukos 10 % ordinaras
- Öka måltidsdosen (frukost, lunch, middag):

P-Glukos	Öka måltidsdosen
> 17 mmol/l	50 % Apidra, Humalog eller Novorapid sc
> 12 mmol/l	25 % Apidra, Humalog eller Novorapid sc
> 10 mmol/l	10 % Apidra, Humalog eller Novorapid sc

Extra kvälls och nattetid och ny kontroll efter 4 timmar

P-Glukos	Extra Ordination
> 20 mmol/l	6 E Apidra, Humalog eller Novorapid sc
> 15 mmol/l	4 E Apidra, Humalog eller Novorapid id sc

•